التباينات المكانية لتراكيز المواد النفطية في مياه ورواسب مجرى شط العرب (قضاء أبي الخصب) وإثارة البيئية

أ.م.د. سرور عبد الأمير حمزة
جامعة البصرة – كلية الآداب

أ.د. نمير نذير مراد علي
جامعة البصرة – كلية التربية للبنات

الملخص:

أظهرت نتائج الدراسة الحالية ان تراكيز الهيدروكربونات النفطية في مياه ورواسب المقطع الطولي المدروس (قضاء ابي الخصب) قد سجلت تراكيز عالية للمواد النفطية في الرواسب القاعية مقارنة مع تواجدها في الكتلة المائية ولكل الفصلين. لتشهد تبايناً فصلياً وموقعياً، حيث ارتفعت نسبتها خلال الفصل الشتاء مقارنة بالفصل الصيف، بسبب أن البكتريا تكسر الهيدروكربونات النفطية في مدى حرارة (30-40) درجة مئوية، وان انخفاض درجة الحرارة تقلل من نشاط الأحياء المحللة للمواد النفطية، أما موقعياً فقد ارتفعت قيمها في المحطة الأولى، بسبب قربها من قناة الخورة الاروائية والتي تعد مرسى للمراكب والسفن مع وجود زياده سكانية وانخفضت في المحطة الثانية والثالثة .

الكلمات المفتاحية: مواد نفطية, رواسب قاعية, ملوثات هيدروكربونية.

Spatial Variations Of The Concentrations Of Petroleum Materials In The Waters And Sediments Of The Shatt Al-Arab River In (Abu Kasib District) And Environmental Effects

Assistant.Prof Dr.Sorour Abdul-Amir Hamzah

Prof.Dr.Nameer Nathir Murad Ali

srwrdrktwrt@gmail.com

nkhiaat@yahoo.com

Basra University -College of Arts

University of Basra -College of Education

for Girls

Abstract :

The results of the current study showed that the concentrations of petroleum hydrocarbons in the water and sediments of the longitudinal section studied (Abu Al-Khasib District) recorded high concentrations of petroleum materials in the bottom sediments compared to their presence in the water mass for both seasons .To witness seasonal and locational variation,Its percentage increased during the winter compared to the summer, The reason is that bacteria break down petroleum hydrocarbons in a temperature range 30-40 degrees Celsius, and a lower temperature reduces the activity of organisms that decompose petroleum materials,As for our two locations,their values increased in the first station, due to its proximity to the Al-Khorah irrigation canal,which is a berth for boats and ships,with a population increase, and they decreased in the second and third stations.

Keywords:petroleum materials, Basement sediments, Hydrocarbon pollutants.

المقدمة :-

يتأثر مجرى شط العرب في محافظة البصرة بظاهرة المد والجزر التي تحدث في مياه الخليج العربي لذا أصبح من الضروري تسليط الضوء على طبيعة هذه الحركة ونوعها، إذ يتحرك سطح البحر حركة توافقية على السواحل صعوداً وهبوطاً كل يوم بقدر معلوم، وتعرف هذه الحركة بالمد والجزر. وينجم عن هذه الحركة تيارات مديّة تندفع في القنوات الساحلية أو في مصبات الأنهار بسرعة كبيرة. وقد يعلو سطح الماء في تلك المصبات والخلجان علواً كبيراً، ويتميز الجزء الشمالي من الخليج العربي بنظام للمد والجزر يختلف عن معظم أجزاء الخليج ومن أهم السمات الأساسية لهذا النظام (سلمان وآخرون، 1993)، هو نظام الخليط للمد والجزر السائد هو (النظام اليومي ونصف اليومي)؛ كل (6) ساعات أن المد في منطقة الخليج العربي معقد وليس هناك قياسات مباشرة متوفرة له. وتكون معدلات المد والجزر كبيرة تصل إلى أكثر من متر واحد فسي معظم سواحل الخليج وتزيد على ثلاثة أمتار في منطقة شط العرب وعموماً إن ظاهرتي المد والجزر كانتا مسؤولتين عن دفع الكتلة المائية إلى اعلي مجرى شط العرب في محافظة البصرة خلال وقت المد وفي الوقت نفسه خروج الكتلة المائية من مجرى شط العرب خلال وقت الجزر واعتمادا على الميل المائي يكون دخول الكتل المائية الى المقطع المدروس في منطقة الدراسة وخروجها منها وهذا يسهل عملية تبادل الكتل المائية بين مجرى شط العرب وبين مياه الخليج العربي مما يدفع الى نقل الملوثات الهيدروكربونية من شمال شط العرب الى المقطع الطولي المدروس في وسط المجرى ومن الخليج العربي الى المقطع المدروس أيضا.

التلوث بالهيدروكربونات النفطية :-

تتميز الهيدروكربونات النفطية بانتشارها السريع على سطح الماء وتكون طبقة رقيقة سمكها بين (1-2) سم فوق سطح الماء وتقوم هذه الطبقة بعزل سطح الماء عن الغلاف الغازي وتمنع تبادل الغازي بينهما. ويمتاز شط العرب بوجود العديد من البقع النفطية لوجود اللجات والقوارب ومحطات تعبئة الوقود ومسفن الداكير وابو فلوس. ويشكل النفط والمخلفات النفطية أهم الملوثات التي تطرح الى مياه شط العرب وقنواته الفرعية وهذا الملوث تأتي من مصادر متعددة (حسين وآخرون, 1991):

- 1- إنتاج النفط ونقله عن طريق الناقلات والبواخر .
- 2- المصافي النفطية كمصفي المفتية والمعقل ومصفي عيوان النفطية وميناء ابو فلوس النفطية.
- 3- البقايا الزيتية القليلة المتنوعة للغاية التي تطرحها المنشآت الواقعة على أطراف النهر ومثال ذلك المرافق التي تستقبل زيوت التفرغ وفضلات الدهون المحترقة من المكين والتوربينات .
- 4- تبخر الهيدروكربونات النفطية وانتقالها الى الجو وسقوطها في المياه .
- 5- الزرع الطبيعي كما هو الحال في منطقة نهران عمر (قرب معمل الورق) وما تسبب هذه الظاهرة من بقع زيتية منتشرة على المياه وبالتالي تزيد من مشكله التلوث .
- 6- الفضلات المنزلية والمخلفات المدنية والصناعية

يعتبر شط العرب احد أهم الأنهر الداخلية في العراق لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية متعددة فهو المصدر الرئيسي لمياه الشرب لمدينه البصرة وكما يعتبر من المصادر المائية المستعملة في صيد الأسماك النهرية والفعاليات المنزلية والصناعية وإرواء المواشي والدواجن ونمو المحاصيل وبالرغم من أهميته المبينة أعلاه إلا ان شط العرب يعاني من استقبال المخلفات المختلفة من مخلفات صناعية وزراعة ومنزلية لقد حظيت مسألة التلوث البيئي وأنواعه ومسبباته وطرق معالجته باهتمام واسع على النطاق العالمي والإقليمي والقطري وذلك من اجل حماية البيئة المائية كما يتعرض شط العرب وقنواته الفرعية إلى تلوث نفطي من خلال مصادر عديدة منها طريقة تحميل الحاويات وتفرغها وحوادث ناقلات النفط فضلا عن تسرب النفط أثناء الشحن والتفريغ وخاصة من ميناء أبو فلوس وهذا التلوث حتما يصل إلى المحطات المدروسة بواسطة ظاهرة المد والجزر.

مشكلة الدراسة :-

تتلخص مشكلة البحث بالسؤال التالي: هل ان تراكيز المواد النفطية في المقطع الطولي المدروس تساهم في تلوين مياه ورواسب شط العرب وهل يعكس سلبي على البيئة .

هدف الدراسة:- تهدف الدراسة الى ما يلي:

تحديد التغيرات الفصلية والموقعة لتراكيز الهيدروكربونات النفطية في مياه ورواسب المقطع المدروس في قضاء أبي الخصيب ولفصلي الصيف والشتاء، وتحديد أثارها البيئية .

الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة:-

يقع قضاء ابي الخصيب في الجزء الجنوبي الشرقي من العراق خارطة (1) وإداريا ضمن حدود محافظة البصرة. يحد القضاء من الشمال قضاء البصرة ومن الشرق مجرى شط العرب أما من جهة الغرب قضاء الزبير ومن الجنوب يحده قضاء الفاو تبلغ مساحة القضاء (1152) كم² أما الموقع الفلكي يقع القضاء بين دائرتي (30.15 – 31.27) شمالا وقوسي الطول (46.20- 46.8) شرقا، واقتصرت الحدود المكانية لمنطقة الدراسة على تحليل المياه والرواسب في المقطع الطولي الأوسط لمجرى شط العرب (قضاء ابي الخصيب) وحددت خمسة محطات جدول (1) خارطة (2) ولرصد كمية المواد النفطية في عينات المياه ونماذج الرواسب جمعت عينات المياه من وسط المجرى ومن عمق نصف متر وحفظت في قناني زجاجية معتمة لمنع الأكسدة وجمعت نماذج الرواسب من قاع المجرى وتمثل البعد الزمني للبحث شهر حزيران 2023 وشهر كانون الأول لنفس السنة وحلت العينات والنماذج في مختبرات شركة نفط الجنوب، وكان موقع المحطة الأولى في مجرى شط العرب قرب قناة الخورة الاروائية والثانية إمام قناة مهجران الاروائية والثالثة امام قناة محيلة الاروائية والرابعة أمام قناة ابو فلوس الاروائية والخامسة إمام قناة السبية الاروائية .

جدول (1)

احداثيات المواقع المدروسة في مجرى شط العرب

المحطة	خطوط الطول	خطوط العرض
الأولى	46 10. 31 "E	31 27. 46 "N
الثانية	46 12. 5 "E	31 21. 36 "N
الثالثة	46 16. 5 "E	31 17. 40 "N
الرابعة	46 20. 26 " E	31 15. 11 "N
الخامسة	46 8. 54 " E	31 26. 45 "N

المصدر: من عمل الباحثة باستخدام جهاز (GPS).

خارطة (1) موقع منطقة الدراسة من محافظة البصرة والعراق

المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على الهيئة العامة للمساحة قسم التصوير الجوي. خارطة العراق الطوبوغرافية: مقياس الرسم: 1/250000 لسنة 2010.
 خارطة (4) محطات الدراسة على المقطع المدروس من مجرى شط العرب

المصدر:

من عمل الباحثة اعتمادا على: الهيئة العامة للمساحة، قسم التصوير الجوي، خارطة العراق الطبوغرافية، مقياس الرسم: 1/250000 ، لسنة 2010 .

تراكيز الهيدروكربونات النفطية في مياه مجرى شط العرب

تبين من جدول رقم (2) ان الهيدروكربونات النفطية في مياه مجرى شط العرب المقطع المدروس بلغت في المحطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة لفصل الصيف (15,2 – 7,5 – 8,7 – 14,3 – 16,1) مكغم/لتر على الترتيب وبمعدل (12,36) مكغم/ لتر وارتفعت في فصل الشتاء وبلغت في المحطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة (21,1 – 10,2 – 16,3 – 19,2 – 20,1) مكغم/لتر على الترتيب وبمعدل (17,42) مكغم/لتر غير أن هذه التراكيز ارتفعت في المحطة الأولى والخامسة لكثرة التجمعات السكانية وكثرة الزوارق والمراكب والسفن الراسية مقارنة مع المحطات الأخرى.

جدول (2)

تراكيز الهيدروكربونات النفطية (مايكروغرام/ لتر) في مياه مجرى شط العرب لسنة 2023

المحطات	فصل الصيف (شهر حزيران)	فصل الشتاء (شهر كانون الاول)
الأولى	15,2	21,1
الثانية	7,5	10,2
الثالثة	8,7	16,3

الرابعة	14,3	19,2
الخامسة	16,1	20,1
المعدل	12,36	17,42

المصدر: من عمل الباحثة اعتماداً على التحاليل المختبرية .

تراكيز الهيدروكربونات النفطية في رواسب مجرى شط العرب :-

تبين من جدول (3) ان تراكيز الهيدروكربونات النفطية في رواسب المحطات المدروسة (الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة) (27,2- 17,6 - 19,1 - 22,2 - 25,3) مكغم/لتر على الترتيب وبمعدل (22,28) مكغم /لتر لفصل الصيف اما في فصل الشتاء بلغت تراكيز الهيدروكربونات النفطية في الرواسب المحطة (الأولى- والثانية-والثالثة- والرابعة - والخامسة) (21,2- 23,4 - 26,5 - 29,1 - 26,24) مكغم /لتر على الترتيب وبمعدل (26,24) مكغم /لتر .

جدول (3)

تراكيز الهيدروكربونات النفطية (مايكروغرام/ لتر) في رواسب مجرى شط العرب لسنة 2023

المحطات	فصل الصيف (شهر حزيران)	فصل الشتاء (شهر كانون الأول)
الأولى	27,2	31,2
الثانية	17,6	21,2
الثالثة	19,1	23,4
الرابعة	22,2	26,5
الخامسة	25,3	29,1
المعدل	22,28	26,24

المصدر: من عمل الباحثة اعتماداً على التحاليل المختبرية.

تبين من الجداول (2-3) ان الهيدروكربونات النفطية تزداد في فصل الشتاء لعينات المياه ونماذج الرواسب مقارنة مع فصل الصيف ويرجع السبب الى انخفاض درجات الحرارة وقلة نشاط الأحياء المحللة للمواد النفطية في فصل الشتاء كما انها تزداد في المحطات (الأولى والخامسة) من المحطات المدروسة وذلك لقرب المحطة الأولى من التجمعات السكانية كما أنها تعد مصب لقناة الخورة الأروئيه وكثرت الزوارق والنجات والمراكب ومخلفات السفن الراسية في مياه شط العرب أما المحطة الخامسة قرب ناحية السببية وقرب مصفى عبادان الإيراني. وتقل نسبها في المحطة الثانية والثالث مقارنة مع باقي المحطات وهذا بسبب قلة الفضلات الناتجة من التجمعات السكانية وبعدها من مركز القضاء، بالنسبة للتوزيع الفصلي فقد دلل على وجود تغيرات فصلية كبيرة فقد بلغ اعلي تركيز للهيدروكربونات النفطية في المياه والرواسب في فصل الشتاء ولكافة المواقع المدروسة واما اقل تركيز فقد لوحظ خلال فصل الصيف كما موضح في جميع بالجدول (2-3) ان هذه التراكيز في المحطات المدروسة اما من مياه شط العرب او من الفضلات المنزلية والصناعية الموجودة محليا من خلال القنوات الأروائيه يعتقد (Al-Saad, 1983), ان تلوث مياه المحطات المدروسة مصدرها من شط العرب والقنوات الأروائيه من خلال الفضلات المنزلية والمخلفات المدنية والصناعية وتخضع درجة حرارة مياه شط العرب لتغيرات فصلية حيث وجد ان الاختلاف الفصلي على سبيل المثال تتراوح بين (11-12) درجة مئوية في كانون الأول وتصل الى 35 درجة مئوية في شهر حزيران جدول (4) كما ويلاحظ بان تراكيز الهيدروكربونات النفطية في مياه شط العرب والقنوات المدروسة ذات علاقة عكسية مع درجة الحرارة فعندما تكون درجة الحرارة اعلى 30 درجة مئوية في (فصل والصيف) فان كمية الهيدروكربونات النفطية تكون قليلة مقارنة بكمياتها عندما تكون درجة الحرارة اقل من 30م في فصل الشتاء كونها معرضة للتبخر. بسبب التأثير المباشر لدرجة الحرارة على تبخر الهيدروكربونات النفطية في الماء فان الزيادة في درجة الحرارة سوف تؤدي الى زيادة فعالية البكتريا وبالتالي زياة في عملية تكسير الهيدروكربونات النفطية المتواجدة في الماء حيث لاحظ (Douabul & Al-saad, 1985), بوضوح تغيرات فصلية في معدل قيم المادة العالقة والهيدروكربونات النفطية على امتداد مجرى شط العرب، وهذا يؤكد أيضا ان معظم الهيدروكربونات النفطية الموجودة في المحطات المدروسة هي ناتجة بسبب عوامل حضرية تتمثل بالنشاط الصناعي والكثافة السكانية العالية والتوسع الحضري والسكن العشوائي وهذا ما أكده (Law, 1981) في الوقت نفسه كانت جميع قيم الهيدروكربونات النفطية جميعاً للفصل الرطب أكثر من الفصل الجاف، والسبب أن البكتريا تكسر الهيدروكربونات النفطية في مدى حرارة (25-30) درجة مئوية ولهذا السبب تقل في الفصل الصيف وتكثر في الفصل الشتاء جدول (4) حيث بلغت متوسط درجات الحرارة للأشهر (حزيران - تموز - اب - ايلول) (33.85 - 35,8 - 35 - 31,45) درجة مئوية على الترتيب. وهذه الأشهر كافية لتبخر الهيدروكربونات الخفيفة وقد تبين ان المواد الهيدروكربونية النفطية في المحطات (الأولى والخامسة) تكون على شكل بقع نفطية طافية مقارنة مع المحطات المدروسة ولما كانت منطقتنا تتميز بشدة إضاءتها وطول النهار وخصوصا في فصل الصيف لأنها منطقة شبة استوائية وتوفر غاز الأوكسجين المذاب في الماء فان هذا يعني زيادة في عملية الأوكسدة الضوئية في فصل الصيف مما يؤدي الى تقليل لكمية الهيدروكربونات النفطية المتواجدة في مياه ورواسب شط العرب خلال هذا الفصل وإشارة الى ما جاء أعلاه يتضح جليا تأثير الهيدروكربونات النفطية المتواجدة في مياه شط العرب بالتغير الفصلي من ناحية الحرارة والفعاليات البكتيرية والأوكسدة الضوئية حيث تزداد هذه العوامل في فصل الصيف مؤدية الى تقليل تراكيز الهيدروكربونات النفطية أما في فصل الشتاء فان هذه العوامل تكون قليلة التأثير على تراكيز الهيدروكربونات النفطية المتواجدة في مياه شط العرب.

جدول (4)

المعدلات الشهرية والسوية لدرجات الحرارة (المتوسطة) مئوية في منطقة الدراسة للفترة من 2015-2022

الشهور	المتوسط (منوي)
كانون الثاني	10.70
شباط	13.15
آذار	17.30
نيسان	23.65
مايس	29.85
حزيران	33.85
تموز	35.8
أب	35.00
أيلول	31.45
تشرين الاول	25.60
تشرين الثاني	17.90
كانون الاول	12.50
المعدل السنوي	23.90

المصدر: الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية, قسم المناخ, بيانات غير منشورة.

الآثار البيئية للملوثات النفطية في مياه ورواسب مجرى شط العرب قيد الدراسة

يعد التلوث النفطي من أخطر أنواع التلوث سواء كان على البيئة المائية أو البيئة الهوائية أو الأرضية، فبمجرد اختلاط النفط بالمياه سواء كان خام أو مشتقاً منها ينتشر انتشاراً سريعاً فوق سطحه نظراً لأن كثافته أقل من كثافة الماء، مما يؤدي إلى تكوين سد مانع بين أكسجين الهواء الجوي وسطح الماء بما يمنع من التبادل الغازي بين الهواء والماء. الأمر الذي يخل على نحو خطير بالتوازن البيئي والوسط الطبيعي والنظم البيئية البحرية وبما يؤثر على مختلف الكائنات والاحياء المائية والطيور البحرية فهو يؤثر من ناحية على تنفس الاحياء بما يعرض حياتها لخطر وهلاك محقق ويؤثر من ناحية أخرى على التركيب النوعي للمياه بالإخلال بخصائصها بما يذوب فيها من مواد هيدروكربونية (الفيل، 2013)، تأثير النفط على البيئة التلوث بالنفط يعني إطلاق عناصر أو مركبات أو مخاليط غازية أو سائلة وصلبة مصدرها النفط إلى عناصر مما يسبب تغيير في وجود هذه العناصر يؤدي تلوث البحار والمحيطات البيئية، التي هي الهواء والماء والتربة، بالنفط إلى مجموعة كوارث حقيقية في غاية الخطورة فمنها ما يمكن ملاحظته وحصره والسيطرة عليها، يتوزع ضرر التلوث بالنفط على كافة أشكال الحياة "الإنسان والكائنات الحية البحرية والبرية والطيور والنباتات" ويؤدي بالنهاية إلى موت وكافة انقراض الملايين من الكائنات الحية البحرية ومن الأجناس والأنواع والأحجام وإلى تعطل أغلب الخدمات الملاحية وإلى تدمير السياحة من خلال تلويث المياه والشواطئ وإلى إلحاق الضرر بمحطات تحليه المياه ووصول بعض المواد الكيميائية الناتجة من النفط إلى مياه الشرب والإخفاض كبير في إنتاجية صيد الأسماك، كما يدمر الأيكات النباتية وعلى رأسها غابات المانجروف بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالآلاف الأنواع من الطيور من خلال قتله إلى الاحياء البحرية كاليرقات التي يعتمد عليها في غذاؤه وأيضاً من جراء تلوث الطيور ذاتها بالنفط عند قيامها بصيد تلك اليرقات بالإضافة إلى تأثيرات أكثر خبثاً وهي الوصول إلى غذاء الإنسان، حيث تتجمع وتُخزن مركبات النفط في الكائنات الحية البحرية من أسماك وغيرها من الأصداف والقشريات والروبيان، وتصلنا نحن البشر عبر سلسلة الغذاء عندما يأكلها الإنسان. (الجرعتلي، 2011)

أما بالنسبة إلى صلاحية المياه في القنوات المدروسة للاستخدام البشري والمجالات الأخرى مثل الزراعة والصناعة وتربيته الأسماك وخلال فصلي الدراسة لم تكن في الحدود المسموح بها ضمن المواصفات العالمية والعراقية لأنها تؤثر قيمياً مرتفعة، كما أن التزايد المستمر في طرح الفضلات والمخلفات الصناعية والمنزلية إلى هذه القنوات (المسطح المائي) جعلها تتجه نحو الوضع الكارثي لأن هذه الزيادة تترك بصماتها بشكل سيء على صحة الإنسان من أمراض وأوبئة كما أظهرت الدراسة الحالية تغييرات موقعيه وفصلية واضحة في قيم الهيدروكربونات النفطية وإن القنوات المدروسة جميعاً تعاني تلوثاً نفطياً بسبب المخلفات المنزلية ماعدا قناة الدويب تعاني أقل تلوث مقارنة مع باقي القنوات المدروسة.

وعند فحص كمية الملوثات النفطية من الدراسات السابقة (حسين وآخرون، 1991)، مع هذه الدراسة تظهر ميول نوعية المياه في المحطات المدروسة نحو التدهور مع مرور الزمن إذ ترتفع قيم هذه الملوثات بشكل واضح مع تقدم الزمن حتى وصلت ذروتها في الدراسة الحالية أي أن تدهور نوعية المياه أخذ بالتصاعد وتعني هذه الحقيقة دلالات عديدة منها أن هنالك إهمالاً فعلياً لمراقبة نوعية المياه في منطقة الدراسة وعدم العمل على تحسينها وإن هذا الميل المتصاعد في تردي نوعية المياه يترافق حتماً والزيادة السكانية في مدينة البصرة وتوسعها وتزايد أنشطتها ومن ثم تصاعد كمية الملوثات التي تطرحها مما انعكس سلباً على نوعية البيئة المائية وأخيراً إن مركز قضاء الفاو بثقلها السكاني والتجاري والصناعي تطرح يومياً كميات لا تحصى من الملوثات عبر شبكة من المجاري .

الاستنتاجات :-

نستنتج من هذه الدراسة :

- 1- وجود تراكيز عالية للمواد النفطية في مجرى شط العرب قيد الدراسة بسبب مجموعة من العوامل البشرية حيث لوحظ ان تراكيز المواد النفطية في مياه المحطات المدروسة كانت أقل من تراكيزها في الرواسب المدروسة .
- 2- وجود تباينات فصلية حيث تنخفض التراكيز النفطية في المياه والرواسب في فصل الصيف مقارنة بفصل الشتاء وذلك لارتفاع درجة الحرارة صيفا وتبخر المواد الهيدروكربونية الخفيفة كما لوحظ وجود تباينات موقعيه حيث سجلت المحطة الأولى تراكيز عالية

بسبب الكثافة السكانية ومخلفات الزوارق والمراكب أضافتا الى المخلفات المنزلية التي تلقى من خلال قناة الخورة الاروائية كما سجلت المحطة الثانية والثالثة تراكيز اقل مقارنة مع باقي المحطات لقلة الكثافة السكانية.
3- ارتفاع نسبة التراكيز النفطية في المحطة الرابعة بسبب مياه مجرى الكارون كما سجلت ارتفاعا في المحطة الخامسة بسبب البقع النفطية الطافية من مصفى عبدان وكان لهذه التراكيز النفطية العالية أثرا بيئية.

التوصيات

- 1- تقترح الباحثة على استمرار عملية رفع الرواسب من خلال عملية الكري للتخلص من الرواسب الملوثة كونها خزان او مستودع للملوثات.
- 2- تفعيل دور اللجان للمراقبة على نوعية مياه شط العرب والقنوات الداخلية وتفعيل دور دائرة البيئة في البصرة على آلية طرح الفضلات وخاصة من المراكب والزوارق والسفن.
- 3- مراقبة نوعية المياه المصروفة من دول الجوار كما في نهر السويب والكارون .
- 4- العمل على تغيير صرف مياه المجاري إلى مناطق بعيدا عن مياه القنوات للتخلص من أخطار تلويثها لمياه جنوب محافظة البصرة .
- 5- المتابعة الشديدة لمنشآت الصناعية والعمل على مساعدتها لإيجاد حلول تقنية واقتصادية مقبولة لمعالجة مياهها الملوثة وتصريفها.
- 6- تشديد الرقابة على المنازل والمؤسسات الخدمية والصناعية والمجتمعية ومنعها من محاولة مد أنابيب تصريف المياه الثقيلة إلى الأنهار .

المصادر

- الجرعتلي,مجد (2011): تأثير التلوث النفطي على البيئة المائية والكائنات الحية البحرية.
حسين,نجاح عبود، وآخرون (1991): شط العرب، دراسات علمية أساسية. جامعة البصرة، مركز علوم البحار.
سلمان,حسن هاشم، وآخرون (1993): دراسة المد والجزر في شمال غرب الخليج العربي. جامعة البصرة، مركز علوم البحار.
الفيل,علي عدنان (2013): شرح التلوث البيئي في قوانين حماية البيئة العربي، الطبعة الاولى، جامعة الموصل (المجلد الأولى). جامعة الموصل.
الهيئة العامة للمساحة، قسم التصوير الجوي، خارطة العراق الطبوغرافية، مقياس الرسم: 1/250000 لسنة 2010 .

References

- Al-Jaratli, Majd (2011): The impact of oil pollution on the aquatic environment and marine organisms.
Hussein, Najah Abboud, and others (1991): Shatt al-Arab, basic scientific studies. University of Basra, Marine Science Center.
Salman, Hassan Hashem, and others (1993): Study of tides in the northwest Arabian Gulf. University of Basra, Marine Science Center.
Al-Feel, Ali Adnan (2013): Explanation of environmental pollution in Arab environmental protection laws, first edition, University of Mosul (first volume). University of Al Mosul.
General Authority for Survey, Aerial Photography Department, Topographic Map of Iraq, Drawing Scale: 1/250000 for the year 2010.
Al-Saad, H.T (1983): Abaseline study on petroleum hydrocarbons pollution in Shatt Al-arab River., M.Sc, thesis, college of science , univ of Basrah Iraq
Douabul, A.A.Z, & Al-saad, H.T (1985): Seasonal variation of oil residues in water at Shatt Al-arab River , Iraq Water, Air Soil Pollut , 24.
Law , R.J (1981): Hydrocarbon concentration in water and sediment from U.K. Marine Waters , Determination by fluorescence Spectroscopy , Mar , Poll, Bull 12(5).